



BIRDS OF PREY

SCHEDE GUIDA PRODOTTI

Product information sheets

کتاب معلومات المنتجات

Schede guida

COMPLEMENTI NUTRIZIONALI **BIRDSOFPREY**

EDIZIONE 2018

Information sheets
SUPPLEMENT PRODUCTS
BIRDSOFPREY
EDIZIONE 2018

كتيب المعلومات
المكملات الغذائية
BIRDSOFPREY
نسخة 2018



INDICE

Index الفهرس



■ Breeding pag.4

■ Rearing pag.5



■ Maintenance pag.6

■ Molting pag.7



■ Performance pag.8

■ Recovery pag.9



Schemi d'uso/Usage tables/جدول الاستخدام pag.10

BREEDING

BREEDING è ricco in vitamina A e vitamina E, selenio, carnitina, aminoacidi essenziali, acidi grassi polinsaturi Ω3 e sali minerali, stimola l'attività riproduttiva, favorisce la produzione gametica e la fertilità negli esemplari. L'alto contenuto di astaxantina, un carotenoide di origine naturale caratterizzata da un'elevata azione antiossidante (50 volte superiore rispetto alla vitamina E), svolge un'importante azione protettiva nei confronti dei radicali liberi, causa di infertilità sia maschile che femminile e contribuisce all'ottimale pigmentazione delle cere, importante stimolo visivo per i riproduttori durante il periodo di corteggiamento, utile per l'ottimale espressione del comportamento riproduttivo dei rapaci.

SI CONSIGLIA per le coppie naturali, la distribuzione omogenea della dose da impiegare (calcolata sul peso dei due soggetti) su tutto l'alimento da somministrare.

BREEDING is rich in vitamin A and E, selenium, carnitine, essential amino acids, Ω3 fatty acids and minerals; it stimulates the reproductive functions by supporting the efficiency of gametogenesis and improving fertility. The high content of Astaxanthin, carotenoid of natural origin with a strong antioxidant effect (50 times stronger than Vitamin E), protects against free radicals that cause infertility and it contributes to the pigmentation of cere, important visual stimulus for breeders during the courtship period, useful for the correct expression of the reproductive behavior in the birds of prey.

WE RECOMMEND for natural pairs, the homogeneous distribution of the dose to use (calculated on the total live weight of the pair) on the whole feed to administer.

BREEDING غني بفيتامين الف وفيتامين اى، سيلينيوم، كارنيتينا، الاحماض الامينية الاساسية، الاحماض الدهنية الغير مشبعة اوميغا 3 واملاح معدنية، تعمل على تحفيز نشاط الانتاج، وتعتبر الانتاج الجيني والخصوبة في العيانات. المحتوى العالي الذي يتضمنه من الاستارانتين والكاروتينويد من مصادر طبيعية لها تأثير قوى المفعول كمضاد للأكسدة (اقوى 50 مرة من فيتامين اى)، له تأثير وقائي هام في مواجهة الصوب الخلقية الناتجة عن عدم الخصوبة سواء ذكرية كانت او انثوية، ويسهم في التلوين الامثل للريش والمخالب. تعد عملية التحفيز البصرى من الامور الهامة للمربين اثناء فترة المغازلة، فهو هام لتعبير الامثل لسلوك تكاثر الطيور الجارحة. لكل زوجين طبيعيين من الطيور، فان التوزيع المتجانس للجرعة يجب ان (يتم على اساس وزن كلا من (ازواج الطيور) حيث يتوجب توزيع الجرعة على كامل الوجبة المقدمة و التي يتم تناولها .

MODO D'USO

Dosi: 1g/kg peso vivo del soggetto.

Uso: cospargere la polvere sulla razione di carne quotidianamente.

Durata del trattamento: cominciare la somministrazione 60-75 giorni prima del presunto inizio della deposizione e/o del prelievo del seme; proseguire la somministrazione fino al termine della deposizione o fino alla fine del periodo di raccolta del seme.



INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 1g per kg of live weight of the subject.

Use: spread the powder on the meat ration daily.

Duration of treatment: start the administration of **BREEDING** 60-75 days before the supposed beginning of egg-laying and/or semen collection. Continue the administration until the last egg is laid or until the end of semen collection.



Additivi nutrizionali/Kg - Nutritional additives/Kg - اضافات غذائية / كجم :

E672 Vitamina A/Vitamin A	3000000 U.I.
E671 Vitamina D3/Vitamin D3	4800 U.I.
3a700 Vitamina E/Vitamin E	22000 mg
Calcio gluconato/Calcium gluconate	10000 mg
E300 Vitamina C/Vitamin C	8000 mg
3.2.2. L-Lisina/L-Lysine	8000 mg
3a314 Vitamina PP/ Vitamin PP	5000 mg
Biotina/Biotin	5000 mg
L-Carnitina/L- Carnitine	5000 mg
3c3.6.1. L-Arginina/L-Arginine	5000 mg
3c301 DL-Metionina/DL-Methionine	4000 mg
3a890 Colina Cloruro/Choline Chloride	2000 mg
Vitamina B2/Vitamin B2	1600 mg
Acido Pantotenico/Pantothenic Acid	1500 mg
3a831 Vitamina B6/Vitamin B6	1300 mg
Vitamina B1/Vitamin B1	1000 mg
Vitamina K3/Vitamin K3	600 mg
E1 Solfato ferroso eptaidrato/Ferrous sulphate, eptahydrate	600 mg
E4 Solfato rameico pentaidrato/Copper sulphate, pentahydrate	600 mg
E5 Solfato Manganoso monoidrato/Manganous sulphate, monohydrate	100 mg
3a316 Acido Folico/Folic Acid	90 mg
E6 Zinco ossido/Zinc oxide	50 mg
E8 Sodio selenito/Sodium selenite	25 mg
E2 Ioduro di potassio/Potassium iodide	20 mg
Vitamina B12/Vitamin B12	8 mg

تعليمات الاستخدام

الجرعة: 1 جرام / كجم من الوزن الطائر.

الاستخدام: رش المسحوق على الوجبة المقدمة من اللحوم لكل وجبة يوميا.

مدة المعالجة: يتم تناوله من 60 إلى 75 يوما قبل بدء وضع البيض أو بدء الإخصاب ، ومواصلة تناوله حتى نهاية عملية وضع البيض أو اكتمال عملية التزاوج.

REARING

REARING è un'associazione bilanciata di vitamine idrosolubili utile a riequilibrare il contenuto vitaminico di una razione composta principalmente da carne congelata. Rappresenta un'importante fonte di aminoacidi essenziali (18% proteina), di fattori coadiuvanti ad azione batteriostatica e immunostimolante per il sano e regolare sviluppo dei puli. Il calcio biodisponibile assicura una crescita armoniosa e ossa forti e ben calcificate.

SI CONSIGLIA di attendere almeno 12 ore dalla schiusa prima di fornire il primo pasto. Per i primi 7 giorni di vita fornire ai puli carne finemente tritata (quaglia, piccione o ratto) priva di ossa e semplicemente idratata con acqua sterile. A partire dal 8° giorno di vita iniziare la somministrazione di **REARING** e fornire carne ed ossa tritate (quaglie o piccioni sviscerati e privati della penna o ratti e topi). E' preferibile utilizzare esclusivamente carne congelata per evitare il rischio di parassitosi (cryptosporidium e trichomonas).

REARING is a balanced association of water-soluble vitamins useful for re-balancing the vitamin content of a ration composed primarily of thawed meat. It represents an important source of essential amino acids (18% proteins), it provides bacteriostatic and immunostimulant agents that foster a healthy and proper development of eyes. The bioavailable calcium ensures an harmonious growth and strong, properly calcified bones.

WE RECOMMEND to wait at least 12 hours from hatching before feeding the nestlings. For the first 7 days of life feed eyes finely minced, deboned meat (quail, pigeon or rat), simply hydrated with sterile water. From the 8th day of life start feeding **REARING** together with meat and finely ground bones (quails or eviscerated pigeons without feathers or rats and mice). In order to avoid the risk of parasitic diseases (cryptosporidium e trichomonas), it is recommended to use exclusively thawed meat.

REARING هو مزيج متوازن من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مما يساعد على استعادة التوازن الغذائي من وجبة تتكون أساساً من اللحم الباردة. وهو مصدر مهم للأحماض الأمينية الأساسية (18% من البروتينات)، المحفزات والمساعدات للبحث على الكائنات البكتيرية والمناعية. لضمان نمو صحي ومتوازن للطيور الصغيرة. توافر كرة القدم ضمن نمو متناغم وعظام قوية. الانتظار لمدة 12 ساعة على الأقل بعد الفقس، قبل تقديم الوجبة الأولى. في الأيام السبعة الأولى من العمر يتم تغذية الدجاج الصغير قطع صغيرة من اللحم (السمان والحمام والياور والجرذان) خالية من العظام الرطب ومبللة بالماء المعقم.

بدءاً من اليوم السابع من العمر يتم تقديم رينج قطع صغيرة من اللحم والعظام (السمان، الحمام أو اليماز بدون أشاء وخالية من الريش، أو الفئران والجرذان). يفضل استخدام اللحم المثلجة لتجنب مخاطر الطفيليات (كريبتوسبورديوم و تريشوموناس)

MODO D'USO

Dosi: 1 grammo per 100 g di alimento.

Uso: si consiglia di solubilizzare 1 g di polvere in 5-10 ml di acqua e aggiungere la soluzione a 100 g di carne impiegata per l'imbecco; preparare ed integrare l'alimento ad ogni pasto.

Durata del trattamento: a partire dal 8° giorno di vita somministrare quotidianamente fino al 40-45° giorno di vita o fino al trasferimento sotto balia naturale.



INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 1 g per 100 g of food at every meal.

Use: dissolve 1 g powder in 5-10 ml water; add the solution to 100 g meat used for hand-feeding; prepare and supplement the meat every time you feed the eyes.

Duration of treatment: from the 8th day of life supplement the food daily until the 40-45th day of life or until they fledge.



Additivi nutrizionali/Kg - Nutritional additives/Kg - إضافات غذائية / كجم :

E672 Vitamina A/Vitamin A	350000 U.I.
E671 Vitamina D3/Vitamin D3	7000 U.I.
3.2.2. L-Lisina/L-Lysine	15000 mg
L-Carnitina/L-Carnitine	8000 mg
3a890 Colina Cloruro/Choline Chloride	7500 mg
3c301 DL-Metionina/DL-Methionine	7000 mg
3a700 Vitamin E/Vitamin E	6000 mg
Calcio Gluconato/Calcium gluconate	4000 mg
3a314 Vitamina PP/Vitamin PP	2100 mg
E300 Vitamina C/Vitamin C	1300 mg
E6 Zinco ossido/Zinc oxide	1150 mg
E5 Solfato Manganoso monoidrato/Manganous sulphate, monohydrate	900 mg
Vitamina K3/Vitamin K3	800 mg
Acido Pantotenico/Pantothenic Acid	600 mg
Vitamina B2/Vitamin B2	410 mg
Vitamina B1/Vitamin B1	170 mg
3a831 Vitamina B6/Vitamin B6	170 mg
E4 Solfato rameico pentaidrato/Copper sulphate pentahydrate	125 mg
3a316 Acido Folico/Folic Acid	45 mg
E2 Ioduro di potassio/Potassium iodide	30 mg
Biotina/Biotin	20 mg
E1 Solfato ferroso eptaidrato/Ferrous sulphate, eptahydrate	18 mg
3b302 Cobalto carbonato/Cobalt carbonate	10 mg
E8 Sodio Selenito/Sodium selenite	5 mg
Vitamina B12/Vitamin B12	1 mg

تعليمات الاستخدام

الجرعة: 1 جرام لكل 100 جرام من الطعام.
الاستخدام: يوصى بإذابة 1 جرام من المسحوق في 5-10 مللي من الماء وإضافة هذا المحلول إلى 100 جرام من اللحم المستخدمة في الإطعام، الأهداد و مزج الغذاء لكل وجبة.
مدة المعالجة: يؤخذ يومياً من الأيام الثامنة إلى سن 40-45 يوماً، أو حتى الوقت الذي سيتم نقله إلى حاضنات الطيور.

MAINTENANCE

MAINTENANCE è un nutrimento formulato per assicurare l'adeguato apporto di vitamine, minerali e aminoacidi essenziali ai rapaci alimentati con prede intere o parti di esse, siano esse fresche o congelate. Rappresenta un'importante fonte di acidi grassi $\Omega 3$ di origine animale altamente assimilabili dalle specie carnivore (come i rapaci) e con importanti effetti vasculo- e cardioprotettivi, utili nella prevenzione delle malattie cardiovascolari dei falconi. È inoltre ricco di Astaxantina, un carotenoide naturale che, oltre a contribuire all'ottimale pigmentazione delle cere dei falchi, è caratterizzata da un'elevata azione antiossidante (50 volte superiore rispetto alla vitamina E) e svolge uno spiccato effetto protettivo a livello tissutale.

Si **CONSIGLIA** per l'integrazione di coppie in voliera la distribuzione omogenea della dose da impiegare su tutto l'alimento da somministrare. Utile anche durante il periodo di allevamento dei pulli da parte dei genitori.

MAINTENANCE is a nourishment formulated to ensure the proper intake of vitamins, minerals and essential amino acids to raptors fed with whole preys of parts thereof, both fresh or frozen. It represents an important source of $\Omega 3$ fatty acids of animal origin easily assimilable by carnivorous species (like the birds of prey), with important cardiac and vascular protective effects, useful in preventing cardiovascular disorders in falcons. **MAINTENANCE** is also rich in Astaxanthin, a natural carotenoid which is responsible for the optimal pigmentation of the falcons' cere and is renowned for its strong antioxidant action (50 times stronger than vitamin E) and its tissue-protective action. **WE RECOMMEND** to sprinkle evenly the dose on the meat ration to complete the diet of pairs in aviary. It is also useful for growing nestlings when reared by natural parents.

تمثل مصدرا هاما للأحماض الدهنية أوميغا 3 مشتقة من الحيوانات والتي يمكن استيعابها إلى حد كبير بواسطة الطيور آكلة اللحوم (الطيور الجارحة) والتي تتميز بتأثير فعال على أمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى ذلك فهو هام لوقاية الصقور من أمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تتعرض لها. بالإضافة إلى أنه غني بمادة أستاكانتينا، التي هي بمثابة كاروتينيد طبيعي يساهم في تحسين صبغة ألوان الصقور، وتتميز بتأثير عالي وفعال كمضاد للأكسدة (بفوق 50 مرة تأثير فيتامين إي) ولها تأثير وقائي قوي وفعال فيما يتعلق بالانسجة. هو طعام ثمر أعداده لضمان توفير فيتامينات، معادن واحماض امينية للطيور التي تتغذى على فرائس كاملة أو اجزاء منها، سواء كانت طازجة أو مجمدة.



Additivi nutrizionali/Kg - Nutritional additives/Kg -

إضافات غذائية / كجم :

E672 Vitamina A/Vitamin A	1000000 U.I.
E671 Vitamina D3/Vitamin D3	3500 U.I.
3a700 Vitamin E/Vitamin E	12000 mg
E300 Vitamina C/Vitamin C	10000 mg
Calcio gluconato/Calcium gluconate	3500 mg
3.2.2. L-Lisina/L-lysine	3000 mg
Acido Pantotenico/Pantotenic Acid	2500 mg
3a314 Vitamina PP/ Vitamin PP	2000 mg
Vitamina B2/Vitamin B2	1500 mg
3c301 DL-Metionina/DL-Methionine	1500 mg
Taurina/Taurin	1500 mg
3a890 Colina Cloruro/Choline Chloride	1100 mg
E1 Solfato ferroso eptaidrato/ Ferrous sulphate, eptahydrate	1000 mg
L-Carnitina/L- Carnitine	1000 mg
Vitamina B1/Vitamin B1	800 mg
3a831 Vitamina B6/Vitamin B6	800 mg
Vitamina K3/Vitamin K3	700 mg
E6 Zinco ossido/Zinc oxide	500 mg
3a316 Acido Folico/Folic Acid	350 mg
E5 Solfato Manganoso monoidrato/Manganous sulphate, monohydrate	300 mg
Biotina/Biotin	150 mg
E4 Solfato rameico pentaidrato/Copper sulphate, pentahydrate	90 mg
E2 Ioduro di potassio/Potassium iodide	70 mg
3b302 Cobalto carbonato/Cobalt carbonate	30 mg
E8 Sodio Selenito /Sodium selenite	10 mg
Vitamina B12/Vitamin B12	6 mg

MODO D'USO

Dosi: 1 g per kg di peso vivo del soggetto.
Uso: cospargere la polvere sulla razione di carne.
Durata del trattamento: quotidianamente.



INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 1 g per kg (live weight) of the subject.
Use: spread the powder directly on the meat ration.
Duration of treatment: daily.

تعليمات الاستخدام
الجرعة: 1 جرام لكل كجم من وزن للطاقر.
الاستخدام: رش المسحوق على الوجبة المقدمة .
مدة المعالجة: يتم تناوله يوميا.

MOLTING

MOLTING, durante il periodo della muta, assicura il corretto apporto di nutrienti per un migliore e rapido ricambio delle penne nei falconi, utile anche in caso di quadri di distrofia follicolare o alterato accrescimento delle penne in rapaci giovani ed adulti. Contiene anche lieviti inattivati utile a rafforzare le difese immunitarie e, di conseguenza, a sostenere la funzione metabolica dei rapaci durante il difficile periodo della muta. Rappresenta un'importante fonte di acidi grassi insaturi $\Omega 3$ ed Astaxantina, potente antiossidante di origine naturale che svolge un'azione protettiva sull'apparato cardiocircolatorio. Si CONSIGLIA di aggiungere quotidianamente **MOLTING** alla razione durante il periodo di muta per soddisfare il fabbisogno di vitamine (in particolare del gruppo B e Biotina), sali minerali, ed aminoacidi essenziali necessari per una muta ottimale.

During the molting period, **MOLTING** ensures the correct nutrient intake for a better and faster replacement of feathers in falcons. It is also useful in case of follicular dystrophy or feather growing problems both in young and adult raptors. **MOLTING** also contains inactive yeasts, useful to strengthen the immune system, and, as a consequence, to support the metabolic function of the birds of prey during the difficult period of molting.

It represents an important source of unsaturated $\Omega 3$ fatty acids and Astaxanthin, a strong antioxidant of natural origin, which has a protective action on the cardiovascular system.

WE RECOMMEND to add **MOLTING** everyday to the meat ration during the molting period, to satisfy the need for vitamins (in particular those of B Group and Biotin), minerals, essential amino-acids necessary for a good molting.

MOLTING أثناء فترة تغيير الريش، يساهم بصورة فعالة في سرعة وجودة تغيير ريش الصقور، ومفيد أيضا في حالة ضمور الريش و النمو المعيب لريش الصقور الصغيرة والبالغة. يحتوي أيضا على الخمائر الكامنة والمقيدة لتقوية الجهاز المناعي، ومن ثم دعم عملية التمثيل الغذائي للطيور الجارحة أثناء الفترة الصعبة لتغيير الريش. يمثل مصدرا هاما للأحماض الدهنية الغير مشبعة أوميغا 3 وإستراتين كمضاد قوى للأكسدة من مصادر طبيعية والذي يعمل كمقوى فعال للقلب والأوعية الدموية. إلى وجبات الغذاء يوميا أثناء فترة تغيير الريش لتلبية احتياجات الصقور من الفيتامينات (وخاصة مجموعة فيتامين ب والبيوتين)، أملاح معدنية، والأحماض الامينية الاساسية التي تضمن تغيير ممتاز للريش.

MODO D'USO

Dosi: 1 g per kg di peso vivo del soggetto.
Uso: cospargere la polvere sulla razione di carne.
Durata del trattamento: quotidianamente per tutto il periodo di muta.



INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 1 g per kg (live weight) of the subject.
Use: spread the powder directly on the meat ration.
Duration of treatment: daily, during all the molting period.



Additivi nutrizionali/Kg - Nutritional additives/Kg - إضافات غذائية / كجم :

E672 Vitamina A/Vitamin A	2500000 U.I.
E671 Vitamina D3/Vitamin D3	7000 U.I.
E300 Vitamina C/Vitamin C	15000 mg
Biotina/Biotin	10000 mg
3a700 Vitamin E/Vitamin E	9000 mg
L-Carnitina/L-Carnitine	9000 mg
Calcio gluconato/Calcium gluconate	7000 mg
3.2.2. L-Lisina/L-Lysine	6000 mg
3c301 DL-Metionina/DL-Methionine	6000 mg
3a314 Vitamina PP/ Vitamin PP	3000 mg
3a890 Colina Cloruro/Choline Chloride	2500 mg
Vitamina B2/Vitamin B2	1600 mg
Acido Pantotenico/Pantothenic Acid	1500 mg
3a831 Vitamina B6/Vitamin B6	1300 mg
Vitamina K3/Vitamin K3	1000 mg
Vitamina B1/Vitamin B1	1000 mg
E1 Solfato ferroso eptaidrato/Ferrous sulphate, eptahydrate	1000 mg
Taurina/Taurine	1000 mg
3a316 Acido Folico/Folic Acid	550 mg
E6 Zinco ossido/Zinc oxide	500 mg
E5 Solfato Manganoso monoidrato/Manganous sulphate, monohydrate	100 mg
E2 Ioduro di potassio/Potassium iodide	90 mg
E4 Solfato rameico pentaidrato/Copper sulphate, pentahydrate	80 mg
3b302 Cobalto carbonato/Cobalt carbonate	30 mg
E8 Sodio Selenito/Sodium selenite	10 mg
Vitamina B12/Vitamin B12	6 mg

تعليمات الاستخدام

الجرعة: 1 جرام / كجم من وزن الطائر.
الاستخدام: رش المسحوق على الوجبة المقدمة من اللحوم لكل وجبة.
مدة المعالجة: يتم تناوله يوميا طيلة فترة تغيير الريش .

PERFORMANCE

PERFORMANCE contiene Ginseng ed altri efficaci nutrienti che agiscono in combinazione per ottimizzare la capacità e la resistenza muscolare e, al tempo stesso, incrementano l'attività metabolica che stimola l'appetito e incrementa la risposta predatoria. Grazie ad una attenta e bilanciata formulazione, assicura un adeguato apporto di vitamine, sali minerali ed aminoacidi fondamentali per sostenere l'efficienza funzionale fisica dei soggetti nel periodo di massimo impegno fisico e sportivo. Rappresenta, inoltre, una fonte di acidi grassi insaturi $\Omega 3$ ed Astaxantina con un'importante azione protettiva sull'apparato cardiocircolatorio. **SI CONSIGLIA** il monitoraggio veterinario se si superano i 3 cicli consecutivi (o periodi di somministrazione superiori ai 25 giorni).

PERFORMANCE contains Ginseng and other effective nutrients which act together to improve stamina and endurance and, at the same time, to boost the metabolism and stimulate the appetite, increasing the predatory instinct.

Thanks to an thorough and balanced formulation, **PERFORMANCE** ensures the right intake of vitamins, minerals and amino acids necessary to support metabolism in stressful conditions specially during the most challenging period of hunting and training.

PERFORMANCE is also an important source of unsaturated $\Omega 3$ fatty acids and Astaxanthin, (strong antioxidant of natural origin) which have got a protective action for the cardiovascular system.

WE RECOMMEND the veterinary supervision in case of 3 or more consecutive treatments are done, or if the treatment is administered for more than 25 days.

PERFORMANCE يحتوي على الجينسنج ومقويات أخرى فعالة وذات تأثير متوافق لتحسين القدرة والقوة العضلية في وقت متزامن، تؤدي إلى زيادة نشاط العمليات المتصلة ببناء البروتينولازما والتي تؤدي إلى فتح الشهية ومن ثم تزيد من رد الفعل في حالة القنص والافتراس، بفضل صياغة دقيقة ومتوازنة، والتي تضمن كمية كافية من الفيتامينات، املاح معدنية والاحماض الامينية الاساسية لدعم الكفاءة الوظيفية المادية للطيور أو الحيوانات خلال فترة الجهد البدني والرياضي الاقصى.

علاوة على ذلك فهي تمثل مصدرا للأحماض الامينية المشبعة أوميجا 3 واستانزاتين المضاد للأكسدة والتي تقوم بإجراءات وقائية هامة على القلب والاوعية الدموية. يتوجب الكشف البيطري إذا تعدت 3 دورات متتالية من تقديم العلاج (أو فترة تناول المنتج لأكثر من 25 يوما)

MODO D'USO

Dosi: 1g/kg peso vivo del soggetto.

Uso: cospargere la polvere sulla razione di carne.

Durata del trattamento: durante il periodo di volo (caccia o competizione), somministrare per 5 giorni consecutivi, sospendere per 3 e ripetere il trattamento.



INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 1 g per kg (live weight) of the subject.

Use: spread the powder directly on the meat ration.

Duration of treatment: during the training period (hunting or competition), administer for 5 consecutive days, interrupt for 3 days and repeat the treatment.



Additivi nutrizionali/Kg - Nutritional additives/Kg -

إضافات غذائية / كجم :

E672 Vitamina A/Vitamin A	100000 U.I.
E671 Vitamina D3/Vitamin D3	1500 U.I.
E300 Vitamina C/Vitamin C	11000 mg
L-Carnitina/L-Carnitine	10000 mg
3a700 Vitamin E/Vitamin E	7000 mg
3.2.2. L-Lisina/L-Lysine	6000 mg
3a314 Vitamina PP/ Vitamin PP	4000 mg
Biotina/Biotin	4000 mg
Calcio gluconato/Calcium gluconate	3500 mg
3c301 DL-Metionina/DL-Methionine	3000 mg
Taurina/Taurine	3000 mg
Acido Pantotenico/Pantothenic Acid	2400 mg
Vitamina B2/Vitamin B2	2000 mg
Vitamina B1/Vitamin B1	1500 mg
3a831 Vitamina B6/Vitamin B6	1500 mg
Vitamina K3/Vitamin K3	1000 mg
3a890 Colina Cloruro/Choline Chloride	1000 mg
E1 Solfato ferroso eptaidrato/Ferrous sulphate, eptahydrate	1000 mg
3a316 Acido Folico/Folic Acid	400 mg
E5 Solfato Manganeso monoidrato/Manganese sulphate, monohydrate	300 mg
E6 Zinco ossido/Zinc oxide	300 mg
E2 Ioduro di potassio/Potassium iodide	70 mg
E8 Sodio Selenito/Sodium selenite	10 mg
Vitamina B12/Vitamin B12	7 mg

تعليمات الاستخدام

الجرعة: 1 جرام لكل كجم من وزن الطائر.

الاستخدام: رش المسحوق على الوجبة المقدمة من اللحوم لكل وجبة.

مدة المعالجة: أثناء فترة التدريب (للصيد والمنافسة) يتم تناوله لمدة 5 ايام متتالية ثم التوقف لمدة 3 ايام ومن ثم إعادة الكرة مرة أخرى.

RECOVERY

RECOVERY è ricco di elementi immunostimolanti (lieviti, ginseng, echinacea) e detossificanti (vitamine del gruppo B e silimarina). Sostiene l'organismo nel contrastare la malattia, migliora l'efficacia della risposta immunitaria e contemporaneamente contribuisce alla salvaguardia dell'integrità funzionale del fegato, organo principalmente coinvolto nella degradazione di tossine e farmaci. I componenti del prodotto hanno inoltre un'importante azione prebiotica, agiscono da substrato a livello enterico per la proliferazione di lattobacilli inibenti la replicazione di microrganismi patogeni opportunisti quali Enterobacteriacee o Candida albicans, che in situazioni di deficit fisico ed immunitario (come nel caso di soggetti malati o convalescenti) possono essere causa di gravi complicazioni anche letali. Il prodotto è inoltre una fonte di acidi grassi insaturi $\Omega 3$ ed Astaxantina che svolgono un'importante azione protettiva sull'apparato cardiocircolatorio. Si CONSIGLIA di prolungare la somministrazione per 7-10 giorni dopo il termine del trattamento farmacologico.

RECOVERY is rich in immune booster components (yeasts, Ginseng, Echinacea) and detoxifying substances (group B Vitamins and silymarin). It supports the immune system to fight disorders, it boosts the immune response and contributes to preserve the correct functioning of liver, the main organ responsible for the removal of toxins and medicines. Its ingredients act as strong prebiotics, they support the proliferation of good bacteria (Lactobacillus) in the gut and they inhibit the development of pathogenic enteric bacteria (Enterobacteriaceae or Candida albicans) which, in case of physical debility or weak immune defenses, could be lethal. The product is also an important source of unsaturated $\Omega 3$ fatty acids and Astaxanthin, (strong antioxidant of natural origin) which have a protective action for the cardiovascular system. WE RECOMMEND to prolong the administration for 7-10 days after the end of the therapy.

RECOVERY غني بالعناصر المقوية للمناعة (خمائر، جنسجن، إكيناسا)، التخلص من السموم (فيتامينات المجموعة ب و سيليمارين) وهو يدعم الجسم لمواجهة هذا المرض، ويحسن من فعالية الاستجابة المناعية، وفي الوقت نفسه يحافظ على تكامل الخصائص الوظيفية للكبد. منتج يشتمل بصفة رئيسية على أدوية مضادات السموم. مكوناتها بمثابة البروبيوتيكس قوية، تدعم انتشار البكتيريا الجيدة (المطربة) في القناة الهضمية وأنها تمنع تطور البكتيريا المعوية المسببة للأمراض "البكتيريا الضارة" وفي حالة الضعف الجسدي أو ضعف الدفاعات المناعية يمكن أن تكون قاتلة. بعد المنتج مصدر هام للأحماض الدهنية الغير مشبعة أوميغا 3 وإستاكسانثين المضاد للأكسدة والتي تقوم بإجراءات وقائية هامة على القلب والأوعية الدموية. بإتالة فترة المعالجة من سبعة إلى عشرة أيام بعد الانتهاء من العلاج بالأدوية.

MODO D'USO

Dosi: 1 g per kg di peso vivo del soggetto.
Uso: cospargere la polvere sulla razione di carne.
Durata del trattamento: quotidianamente, in animali sottoposti a terapie farmacologiche o con quadri patologici, sottoposti a quarantena o esposti a situazioni di stress quali cambiamenti ambientali o cambi di gestione.



INSTRUCTIONS FOR USE

Dose: 1 g per kg of live weight of the subject.
Use: spread the powder on the meat ration.
Duration of treatment: daily, for sick raptors, under therapeutic treatment, under quarantine, or exposed to stressful situations (like climate changings or change in management).



Additivi nutrizionali/Kg - Nutritional additives/Kg - إضافات غذائية / كجم :

E672 Vitamina A/Vitamin A	3250000 U.I.
E671 Vitamina D3/Vitamin D3	4000 U.I.
E300 Vitamina C/Vitamin C	18000 mg
3a700 Vitamin E/Vitamin E	13000 mg
3.2.2. L-Lisina/L-Lysine	6000 mg
3a314 Vitamina PP/ Vitamin PP	5000 mg
L-Carnitina/L-Carnitine	5000 mg
3c301 DL-Metionina/DL-Methionine	4000 mg
Biotina/Biotin	2000 mg
3a890 Colina Cloruro/Choline Chloride	2000 mg
Acido Pantotenico/Pantothenic Acid	1650 mg
Vitamina B2/Vitamin B2	1500 mg
3a831 Vitamina B6/Vitamin B6	1500 mg
Calcio gluconato/Calcium gluconate	1500 mg
Vitamina B1/Vitamin B1	1000 mg
Vitamina K3/Vitamin K3	680 mg
E4 Solfato rameico pentaidrato/Copper sulphate, pentahydrate	650 mg
E1 Solfato ferroso eptaidrato/Ferrous sulphate, eptahydrate	620 mg
E6 Zinco ossido/Zinc oxide	300 mg
E5 Solfato Manganoso monoidrato/Manganous sulphate, monohydrate	125 mg
3a316 Acido Folico/Folic Acid	93 mg
E2 Ioduro di potassio/Potassium iodide	20 mg
3b302 Cobalto carbonato/Cobalt carbonate	20 mg
Vitamina B12/Vitamin B12	9 mg
E8 Sodio Selenito/Sodium selenite	7 mg

تعليمات الاستخدام

الجرعة: 1 جرام / كجم من وزن الطائر.
الاستخدام: رش المسحوق على الوجبة المقدمة من اللحوم لكل وجبة.
مدة المعالجة: يوميا، للتطور الجارية المريضة، تحت الرعاية العلاجية، تحت الحجر الصحي، أو التي تتعرض لحالات إجهاد (مثل تغير المناخ أو تغيير في غرف التربية).

SCHEMI D'USO

USAGE TABLES

جدول الاستخدام

PERIODO RIPRODUTTIVO

BREEDING PERIOD

التحضير للتكاثر

PRODOTTO PRODUCT - المنتج	GIORNI - DAYS - أيام								DURATA DURATION المدة الزمنية	DOSI DOSE الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°		
BOP BREEDING									SEMPRE per tutto il periodo ALWAYS for all the period دائما طوال الفترة	1g / kg peso vivo live weight وزن الكائن
NOTA: partendo 60-75 giorni prima dell'inizio della deposizione fino all'ultimo uovo deposto. NOTE: start about 60-75 days before egg-laying and continue until the last egg is laid. ملاحظة: يتم تقديم المنتج قبل 60-75 يوم قبل وضع البيض والاستمرار حتى يتم وضع آخر بيضة.										

ALLEVAMENTO

REARING

التغذية

PRODOTTO PRODUCT - المنتج	GIORNI - DAYS - أيام								DURATA DURATION المدة الزمنية	DOSI DOSE الجرعة
	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°		
BOP REARING									tutti i giorni daily متوفر دائما	1g/ 100 g food
NOTA: partendo dall'8° giorno di vita. NOTE: starting from the 8 th day of life. ملاحظة: يتم البدء بتقديم المنتج منذ اليوم الثامن من الفقس.										

MANTENIMENTO

MAINTENANCE

الوقاية

PRODOTTO PRODUCT - المنتج	GIORNI - DAYS - أيام								DURATA DURATION المدة الزمنية	DOSI DOSE الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°		
BOP MAINTENANCE									tutti i giorni daily متوفر دائما	1g / kg peso vivo live weight وزن الكائن

SCHEMI D'USO

USAGE TABLES

جدول الاستخدام

MUTA

MOLTING طرح الريش

PRODOTTO PRODUCT - المنتج	GIORNI - DAYS - أيام								DURATA DURATION المدة الزمنية	DOSI DOSE الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°		
BOP MOLTING									SEMPRE per tutto il periodo ALWAYS for all the period دائما طوال الفترة	1g / kg peso vivo live weight وزن الكائن

PERFORMANCE

PERFORMANCE الاداء

PRODOTTO PRODUCT - المنتج	GIORNI - DAYS - أيام								DURATA DURATION المدة الزمنية	DOSI DOSE الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°		
BOP PERFORMANCE									5 giorni / 3 giorni pausa 5 days / stop 3 days 5 أيام / 3 أيام راحة	1g / kg peso vivo live weight وزن الكائن

SUPPORTO DURANTE LE TERAPIE

RECOVERY تراكم المواد السمية

PRODOTTO PRODUCT - المنتج	GIORNI - DAYS - أيام								DURATA DURATION المدة الزمنية	DOSI DOSE الجرعة
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°		
BOP RECOVERY									Durante e dopo i trattamenti During and after treatments أثناء وبعد العلاجات	1g / kg peso vivo live weight وزن الكائن

QUALITY
MAKES THE DIFFERENCE
SINCE **1960**



**SINCE 1960 DEVELOPMENT AND RESEARCH FOR PET FOOD,
MEDICATED FEEDING STUFF AND PRE-MIXTURES.**

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia - Italy
Tel. e Fax +39 0522.553616 - www.pinetazootechnici.com